

КАЛЕНДАР ЩЕПЛЕНЬ

Вакцинація та пасивна імунізація

Sprache: Ukrainisch

ВАКЦИНАЦІЯ ВІК

Вакцинація та пасивна імунізація мають бути проведені якомога раніше.
Доцільно перевіряти статус вакцинації у будь-якому віці. Пропущені щеплення необхідно негайно зробити повторно згідно з рекомендаціями для відповідного віку.

Рекомендації постійної комісії з вакцинації (STIKO), 2024. www.stiko.de

ROBERT KOCH INSTITUT



у тижнях			у місяцях							у роках										
00	06	2	3	4	5-7	8-10	11*	12	13-14	15	16-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	≥ 18	60-74	≥ 75
U2/U3		U4		U5			U6		U7			U7a/U8		U9	U10	U11/J1	J2			

PCB	Моноклональні антитіла (одноразова доза) ^a																							
Ротавіруси	G1 ^b		G2	(G3)																				
Правець ^c	G1		N	G2	N	G3 ^d		N			A1	N	A2		N	A ^g								
Дифтерія ^c	G1		N	G2	N	G3 ^d		N			A1	N	A2		N	A ^g								
Коклюш ^e	G1		N	G2	N	G3 ^d		N			A1	N	A2		N	A3 ^g	N							
Гемофільна інфекція ^c Тип В	G1		N	G2	N	G3 ^d		N																
Поліомієліт ^e	G1		N	G2	N	G3 ^d		N							A1	N								
Гепатит В ^c	G1		N	G2	N	G3 ^d		N																
Пневмокок ^c	G1		N	G2	N	G3 ^d		N													S ⁱ			
Менінгокок В ^e	G1		N	G2	N			G3 ^e	N															
Кіп							G1	N	G2											S ^h				
Свинка, краснуха							G1	N	G2															
Вітряна віспа							G1	N	G2															
Менінгокок С							G1		N															
Вірус папіломи людини											G1 G2 ^f		N											
Коронавірусне																	G ⁱ		S ^j (щороку)					
Оперізуєчий герпес																			G1 G2 ^k		N			
Інфлюєнца																			S (щороку)					
PCB (вакцинація)																			S ^l					

ПОЯСНЕННЯ

G БАЗОВА ІМУНІЗАЦІЯ

(до 3-х часткових щеплень

G1 - G3)

S СТАНДАРТНА ВАКЦИНАЦІЯ

A РЕВАКЦИНАЦІЯ

N ПОСЛІДУЮЧА ВАКЦИНАЦІЯ

(Базова імунізація всіх ще не вакцинованих або

Завершення неповної серії вакцинації)

U Скринінгове обстеження

J Обстеження підлітків

(J1 у віці 12–14 років)



- Ⓐ **PCB (моноклональні антитіла):** Народжені в період з квітня по вересень повинні отримати нірсевімаб восени, перед початком першого сезону PCB; Новонароджені будь-якого гестаційного віку, що народилися в сезон PCB (зазвичай з жовтня по березень), повинні отримати нірсевімаб у найкоротші терміни після народження, в ідеалі при виписці з пологового будинку або в період U2 (з 3 по 10 день життя).
- Ⓑ **Rota:** Перша доза вакцини з 6-тижневого віку, залежно від вакцини, 2-а чи 3-я доза вакцини з інтервалом не менш 4 тижнів.
- Ⓒ **TdaPHibIPV/НерВ/Пnc:** Недоношені діти: додаткова доза вакцини у віці 3 місяців, тобто лише 4 дози вакцини.
- Ⓓ **TdaPHibIPV/НерВ/Пnc:** Мінімальний інтервал від попередньої дози: 6 місяців.
- Ⓔ **MenB:** 3 дози у віці від 2 до 23 місяців; з 24 місяців серія вакцинацій складається з 2 доз.
- Ⓕ **HPV:** Дві дози вакцини з інтервалом не менше 5 місяців, з додатковою вакцинацією, починаючи від 15 років або з інтервалом між вакцинаціями менше 5 місяців між 1-ою та 2-ою дозами потрібна 3-я доза.
- Ⓖ **Td(ap):** Ревакцинація Td (проти правця й дифтерії) кожні 10 років. Наступна обов'язкова вакцинація Td - разова вакцинація як Tdap (проти правця, дифтерії, коклюшу) або, за наявності показань, комбінована вакцинація Tdap-IPV (проти правця, дифтерії, коклюшу й поліомієліту).
- Ⓗ **MMR:** Разова вакцинація вакциною MMR (проти кору, свинки, краснухи) для всіх осіб, що народилися після 1970 р. ≥ 18 років з неясним статусом щеплення, без щеплення або тільки з одним щепленням у дитинстві.
- Ⓘ **Пnc:** Рекомендується з PCV20.
- Ⓜ **COVID-19:** Для захисту осіб без основного захворювання необхідні (принаймні) 3 контакти з антигеном, принаймні один з яких унаслідок вакцинації.
- Ⓝ **H. zoster:** Дворазова вакцинація ад'ювантною вакциною проти оперізувального герпесу (інактивованою вакциною) з інтервалом від 2 до 6 місяців.
- Ⓟ **PCB (вакцинація):** Одноразова вакцинація білковою вакциною проти PCB наприкінці літа/осені перед початком сезону PCB.

* Вакцинацію можна робити в кілька прийомів. MMR (проти кору, свинки, краснухи) та V можна призначати на один день або з інтервалом у 4 тижні.

ТЕРМІНИ НАСТУПНОЇ ВАКЦИНАЦІЇ

